

الكآبة النفسية

معرفتها، وفهمها والمساعدة عليها



دليل إرشادي بلغات عِدة للمعتربات والمعتربين في ولاية بايرن



**Das Gesundheitsprojekt
Mit Migranten
für Migranten**

**Ethno-
Medizinisches
Zentrum e.V.**



gefördert durch
Bayerisches Staatsministerium für
Gesundheit und Pflege



Gesund. Leben. Bayern.

BKK®
Betriebskrankenkassen
Landesverband Bayern

Impressum

Depression – Erkennen, Verstehen, Helfen

Mehrsprachiger Wegweiser für Migrantinnen und
Migranten in Bayern

Herausgeber:
Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.
Königstraße 6
30175 Hannover

Konzeption, Inhalt und Erstellung:
Ethno-Medizinisches Zentrum e. V.

Redaktion:
Ahmet Kimil, David Brinkmann, Martin Müller, Nadine
Norton-Erichsen, Ramazan Salman, Elena Kromm-Kostjuk

Übersetzung:
Dolmetscherdienst – Ethno-Medizinisches Zentrum e. V.

Gestaltung und Satz: eindruck.net, Hannover

Bildquellen: Fotolia

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk ist urheberrechtlich
geschützt. Jede Verwendung in anderen als den gesetzlich zu-
gelassenen Fällen bedarf deshalb der vorherigen schriftlichen
Genehmigung durch die Herausgeber.

Wenn in diesem Wegweiser Personengruppen benannt sind,
wird im Folgenden die männliche Schreibweise verwendet. Es
sind aber weibliche und männliche Personen gleichermaßen
gemeint. Dies geschieht aus Gründen des besseren Leseflus-
ses und ist nicht als diskriminierend zu verstehen.

Dieser Wegweiser ist in folgenden Sprachen erhältlich:
Arabisch, Deutsch, Russisch, Türkisch.

Bestellung unter: www.mimi-bestellportal.de

Stand: Dezember 2016 (3. Auflage)

فهرس المحتويات

5 مقدمة

6 ما هي الكآبة النفسية؟

8 ما هي أشكال الكآبة النفسية الموجودة؟

10 كيف تنشأ الكآبة النفسية؟

13 كيف يمكن التعرف على الكآبة النفسية وكيف يتم معالجتها؟

18 ماذا يمكن أن يفعل الأقرباء والأصدقاء والمصابين؟

21 قاموس صغير

25 العناوين

32 تقويم الحالة المزاجية

مقدمة

تحسنًا مفاجئًا للوضع الصحي، والذي يسبب ضغطًا إضافيًّا عليهم. ويمكن أن يقوم المرضى المكتئبين بالإلزاع ك رد على هذا، الذي يجعل في العادة المشاكل أصعب.

تظهر أهمية العوامل الاجتماعية - النفسية المرهقة والمسببة للإضطرابات الكآبية بشكل واضح عند المرضى أو المجموعات التي تعرضت لضغوط كبيرة. يمكن أن تكون هذه الضغوط السبب عند مجموعة كبيرة من المهاجرات والمهاجرين كاحتلال الجنور، وتفكك في العائلة وشبكات الاتصال الاجتماعية، ومشاكل التلاميذ مع لغة وثقافة غريبة، وكذلك أحوال عمل صعبة ومرهقة أو العطالة عن العمل. توجد دلائل تشير إلى أن تكرار الإصابة بالإضطرابات الكآبية تظهر خاصةً وبشكل مرتفع في هذه المجموعة. ولهذا السبب لا يكون هذا مهمًا للأشخاص المصابين بالاكتآبة فقط، بل للمحيط الاجتماعي أيضًا من أجل معرفة المنابع الفردية والعائلية والإجتماعية وتقويتها. ويشمل من بين الأمور قبل كل شيء التأثر الإجتماعي عن طريق العائلة والأصدقاء.

يرغب هذا الدليل ذو الفكرة الرشيدة وبشكل شمولي إعلام المصابين والأقرباء والأشخاص المهتمين بشكل عام من لهم أصول مهاجرة عن موضوع الكآبة. وبهذا إعطاءكم إمكانية بفهم الإزعاج والبحث عن إمكانيات المساعدة في الوقت المناسب. يتم في كل فصل منفرد الإجابة على الأسئلة العامة على حده، مثلًا "ما هو الإكتئاب؟" أو "كيف يتم معالجة الكآبة؟" ويوجد فهرس لعناوين مساعدة وقاموس صغير يتم فيه توضيح التعابير المهمة، والتي تظهر في النص بخط مائل.

الاكتآبة النفسية لها وجوه متعددة. يعني كل شخص تقريبًا مابين الفينة والآخرى من علامات متفرقة كآبية مرضية (أعراض) مثل العزن والتعب النفسي (التحطم النفسي) أو فقدان النشاط الحركي. يتم التكلم أولاً عن الكآبة كمرض محتاج للعلاج، إذا تم تحقيق المعايير المنصوص عليها مرتبطة بكثافة مستمرة لفترة محددة وبشكل واضح.

تقدير نسبة خطرة معرفة الإضطرابات الكآبية (أي الكآبة النفسية) في مراحل الحياة بـ 18.5 %. ويمرض بالاكتآبة في المانيا ما يقارب من خمسة إلى ستة ملايين إنسان كل عام.إصابة النساء بالمرض تكون ضعف عدد إصابة الرجال تقريباً. وتتسبّب الإضطرابات الكآبية غالباً في اختلالات نوعية الحياة والقدرة على القيام بالمشاركة في الحياة اليومية. كما يصعب على المصابين بأمراض الكآبة تحمل تأثيرات المرض بشكل قاس على مدى الشهور وحتى السنوات. من أجل تسمية الأشياء المهمة فقط، تكون أعراض المرض: مشاكل النوم وفقدان النشاط الحركي وعدم الفرح ومشاكل في التركيز أو الإنزعال الإجتماعي التي تظهر في الغالب. يؤثر الإنقطاع عن العمل وتكلّيف المرض المباشرة وغير المباشرة على المرض بشكل شامل وذو أعباء، وعلى عائلة المصاب وكذلك على المحيط الإجتماعي أيضًا.

غالباً ما يكون أفراد الأسرة وزملاء العمل من يتحمل أكثر من طاقتهم بمرات عديدة أثناء التعامل مع هذا المرض العossal، ولهذا لا يمكن الإستغناء عن علاج إختصاصي له. إلى جانب المريض نفسه يحتاج أفراد الأسرة إلى الدعم من أجل التعامل السليم مع أمراض الإكتئاب. يحاول الأقرباء في أغلب الأحيان أن يحلوا مشكلة المريض لكن لا يمكنهم ذلك، أو أنهم ينتظرون

ما هي الكآبة النفسية؟

سلبية قوية جداً في المرحلة الإكتنافية والتي لا يمكنهم التخلص منها. ولهذا تنظر على بالي الأشخاص المصابين في أغلب الأحيان أفكار قتل النفس (الإنتحار)، ويتم الإستنتاج بأن 10 إلى 15 % من المصابين ينتحرون في مرحلة الكآبة هذه.

تحتفل دلائل (عوارض) وأسباب الكآبة من شخص آخر. تظهر الكآبة غالباً بعد ضغوط نفسية قوية أو حوادث حرجية في الحياة، كما هو الحال أثناء العطالة عن العمل أو بعد موت أحد أفراد العائلة. وتكون الضغوط المستمرة في الحياة العملية أو الوحدانية، مثلاً كمتناغد، أسباباً أخرى ممكنة للكآبة. فتفتقر أحياناً أمراض الكآبة بالإرتباط مع أمراض جسدية مثل السكتة الدماغية، ومرض القلب الشديد، ومرض السكري أو مرض الغدة الدرقية. لكن لا يوجد في الغالب أية أسباب خارجية واضحة لأمراض الكآبة وخاصة الأشكال الصعبة منها. المعروف اليوم عن أمراض الكآبة النفسية الصعبة الواضحة هو عدم توازن مواد ناقلة كيميائية محددة (مواد ناقلة عصبية) في الجهاز العصبي المركزي.

بسبب المحرّكات الكثيرة والأسباب المختلفة للمرض يتطلب الأمر القيام بفحص اختصاصي بشكل دائم في حالة الكآبة، وذلك عن طريق طبيب أو معالج نفسي، من أجل معرفة شروط نشوءها بالضبط.

أمراض الكآبة هي من أكثر الأمراض النفسية المنتشرة على الإطلاق. إنها تعبر جامعاً لعدة أمراض مختلفة تؤثر على حياة الأحساس (إضطرابات ثنائية القطب والكآبة النرجسية وغيرها). ويتم أيضاً الكلام عنها كمرض شعبي نظراً لكثرتها ظهرها. تدل التقديرات الناتجة عنها بأن حوالي 5 % تقريباً من سكانmania مصابون بالكآبة حالياً وحوالي 15 – 20 % أصبحوا بها في حياتهم لمرة واحدة على الأقل، وهذه النسبة تمثل إلى الارتفاع. تم التأكيد من وجود الكآبة بشكل متزايد عند النساء مقابل نسبتها عند الرجال.



تظهر الكآبة في كثير من الأحيان عن طريق حالة ضغط مزاجية مرضية كثيبة وقد ان عميق للأمل. يفقد المصابون النشاط الحركي ويحصل عندهم تعب مزمن (هذا يعني طويل الدوام والشكل) مرتبط بإضطرابات نشاط اللياقة الجسدية وإضطرابات قدرة التركيز. يكون عند المصابين بالكآبة أفكاراً

إذا لم يمكن التغلب على التعب النفسي (التحطم النفسي) أو الضغط المزاجي بعد عدة أيام أو أسبوعين، فيمكن أن يوجد مرض الكآبة هنا، فالكآبة التي لم تعالج تستمر إلى وقت طويل. ويندوم المرض لفترة طويلة بحيث أنه لا يمكن للمرء أن يوujeه مباشرةً لحدث خافت مسبب، ولكن يمكن أن تحدث الكآبة بدون حدث خارجي أيضاً.

يكون الإضطراب عند المرضى المصابين بالكآبة مستمراً في كل الحالات تقريباً. فالحالة المزاجية هذه لا تتحسن عن طريق زيارة الأصدقاء وقضاء عطلة ونشاطات أخرى، إنما تسوء غالباً. عندما يفرج الأصدقاء لا يستطيع المصابون بالكآبة مشاركتهم في فرحتهم، والتي تسبب إزدياد سوء الوضع المزاجي. لذلك ينسحب المرضى بإستمرار وإزدياد ويتجنبون الإتصال مع الناس الآخرين.

بشكل مختلف عن حالة العزن العادي، يمكن أن يحصل عند المرضى المكتبيين تقلبات بالمزاج متصلة بمراحل اليوم: مثلاً يكون المصاب حزيناً أو فقد الشجاعة خاصة في الصباح أو قبل الظهر (ما يسمى بالعمق أو الإنحطاط الصباحي)، بينما يحدث تحسن إيجابي ما للمزاج بعد الظهر. ويمكن أن تسير الفترات الزمنية للمزاج بشكل معاكس أيضاً.

الشكوى التالية تدل على وجود مرض الكآبة، إذا استمرت لأكثر من أسبوعين على الأقل:

- الإحساس المتواصل بالحزن، التعب النفسي (التحطم النفسي)، الشك، فقدان الأمل أو فقدان معنى الحياة
- اللامبالاة (عدم الاهتمام بالأمور)، فقدان الفرح، الإنعزal
- تراجع الرغبة بالجنس
- حالات توتر
- آلام في الرأس أو آلام جسدية أخرى
- ضغط وتسرع نبضات القلب، وإضافة إلى ذلك شكاوى جسدية غير واضحة وغير ممكן شرح أسبابها
- فقدان الشهية، نقص الوزن
- إضطراب النوم، التعب
- عدم الهدوء الداخلي (النفسي)
- تباطؤ التكلم و / أو تباطؤ الحركة
- تراجع الإحساس بالقيمة الذاتية (إنعدام الثقة بالذات)
- صعوبات في التركيز
- صعوبات في اتخاذ القرار
- التفكير بالإنتشار

يمكن للكآبة أن تكون في البداية مشابهة لحالة المزاج السيء أو الإضطراب المؤقت. المصابون يكونوا فاقدي الشجاعة ويحسون بفراغ عميق أو حزن. إنهم يهملون أشياء كانوا يقومون بها بسرور في السابق، وربما يرغبون بالبقاء لوحدهم فقط.

ما هي أشكال الكآبة النفسية الموجودة؟

يتم التمييز بين ما يسمى بأمراض الكآبة النفسية أحادية القطب والإضطرابات الكآبية النفسية ثنائية القطب. تتصرف الكآبة النفسية ذات القطب الواحد بانعدام مراحل الهوس. الإشارات الأساسية هي العزن الظاهر وإنعدام السرور واللاملاحة (عدم الاهتمام بالأمور)، والتي يمكن أن تؤدي إلى تعقد الإنتحار.

تستمر الكآبة النفسية الأساسية أو الواقعة الزمنية الكآبية في العادة بشكل مراحل، هنا يعني أنها تظهر ثم تختفي ثم تعود للظهور. الكآبة النفسية الأساسية توصف هنا براقة زمانية واحدة للكآبة.

إذا تكرر ظهور الواقع الزمنية الإكتئابية، فيتم التكلم عن إضطرابات كآبية إنتكاسية. صعوبة الواقع الزمنية الكآبية تنقسم إلى وقائع زمانية بسيطة ومتوسطة الدرجة وصعبة. لا يتم توالي مراحل مرضية أخرى بشكل دائم بعد المرحلة الكآبية الأولى.

ليست كل كآبة هي في نفس الوقت كآبة. توجد عدة أشكال منها، حتى لو تشابهت دلائل المرض مع بعضها البعض، فتوجد أشكال ظاهرية متعددة وبالتالي تعابير مختلفة لهذا المرض أيضاً. فالطبيعة والمعالجون النفسيون يستعملون على الأغلب تعبرية إضطرابات نفسية (عاطفية التأثير). ويتعلق الأمر هنا بجموعة من الإضطرابات النفسية التي تتصرف قبل كل شيء بتغيير مرضي للحالة المزاجية. إما أن تكون العاطفة، أي الحالة الأساسية، ضغطت باتجاه الكآبة أو إرتفعت باتجاه الهوس. كما يمكن أن يظهر هنا التغيير في الحالة الأساسية فجأة ولزمن محدد (حاد) أو بشكل دائم (مزمن) أو عائد أو بشكل مرحلتي (وقائع زمنية). يتم فيما يلي شرح الأشكال الفردية لظهور الكآبة بشكل تقريري.

إضطرابات نفسية (عاطفية التأثير)

إكتئاب ثنائي القطب

إضطراب ثنائي القطب درجة 2

إضطراب ثنائي القطب درجة 1

إضطراب إكتئابي مزاجي دوري

إضطراب موصوف غير معروف

الكآبة النفسية ذات القطب الواحد

إضطراب إكتئابي إنتكاسي

الكآبة النفسية الأساسية أو الواقعة زمانية كآبية

إضطراب موصوف غير معروف

إضطراب إكتئابي مزاجي جزئي

درجة II بواقة زمنية كآية هوسيّة متّبعة بهوس ضعيف (نوع خفيف من الهوس) لمرة واحدة على الأقل.

يتعلّق الأمر في حالة الإضطراب الإكتئابي المزاجي الدوّري بإضطراب كآية مزمن مع عارض هوسيّة وكآية خفيفة متّبادلة.

بالإضافة لهذا يوجد أمراض كآبة أخرى مثل:

- الكآبة الموسمية ("كآبة الخريف والشتاء")
- أمراض الإكتئاب الناتجة عن حوادث خارجية (مثل الصدمات النفسيّة)
- الإكتئاب أثناء العمل واكتئاب فترة النفاس
- الكآبة المرتبطة بالألم جسدية (وتسمى أيضًا الكآبة المقتعة أو المغطاة (اليرقية)): وهي الكآبة الموصوفة بالمتاعب الجسدية التي تبقى بشكل خفي عبر إشارات كآبية. يعني المصابون غالباً من ألام الظهر والرأس والإنتباخ المشير في منطقة الصدر (ضيق الصدر) والإحساس بفقدان التوازن (الدوخة) وأشياء كثيرة أخرى.
- الإكتئاب العضوي: هو إكتئاب يتسبّب به مرض في الجسم، مثل إضطرابات عمل الغدة الدرقية وأمراض الغدة النخامية أو أمراض الغدة الكظرية فوق الكلية أو متلازمة الفص العجمي الدماغي.
- لا تتصف متلازمة الإرهاق (الاحتراق النفسي) مرضاً مستقلّاً، إنما يكون بالأخرى عارضاً مثل ضغط الإرهاق المتواصل في مكان العمل أو في العائلة. لا يستطيع هؤلاء الأشخاص في الغالب أن يدركوا حدود إستطاعتهم ويلاحظون بعد تأخير كبير بأنهم لا يستطيعون المحافظة على التوازن بين "الأخذ والعطاء".

يتعلّق الأمر في حالة الإضطراب الإكتئابي المزاجي الجزعّي بإضطراب نفسي (عاطفي التأثر) مستمر. إنه يتمثّل بحالة فحط مزاجية مزمنة (مستمرة لعدة سنوات)، لكنها لا تصل إلى حجم الكآبة الحقيقية.

يتم في الإضطراب ثنائي القطب / الكآبة النفسيّة تبادل الفترات الزمنية ما بين الكآبة والهوس. وتم في السابق وصف المصابين بـ"المهووسين المكتئبين" أيضاً. فيحصل في مثل هذه الحالات وجود مراحل هوس منغلاً بشكل زائد، يبالغ في إمكانيات قدرته ويتصدّر بالتحمّل حتى العنف. يمكن أن يحدث أيضاً بأن المصاب يلفت النظر بمرحه الزائد عن اللزوم، والذي لا يناسب الوضع الحقيقي. الملفت للنظر أيضاً وجود تفاصيل مبالغ فيه عند المصاب وحاجته إلى التكلم، الذي نادرًا ما يمكن كبح جماحه. يمكن أن يتم تقوية المعاناة الحالية في مرحلة الهوس بإرتفاع الإدمان على الشراء عند النساء، والإدمان على ألعاب (الحظ) عند الرجال أو قرارات مهمة مثل تغيير مكان العمل وشراء مسكن وغيرها أيضاً. ولهذا يجب عدم القيام بإتخاذ أي قرارات مهمة بشكل فردي في مثل هذه المراحل. فهنا تتفّق عوارض الهوس في الغالب كنقيض قوي للمؤشرات المعروفة لواقعة زمنية كآبية. يمكن أيضاً أن تحدث أثناء الهوس تصورات وهن (جنون) أو هلوسة (خداع الأحاسيس). وظاهر مراحل الهوس عند حوالي 10 % فقط من كل الأشخاص الذين يعانون من مرض الكآبة.


يتألف الإكتئاب ثنائي القطب من إكتئاب ثنائي القطب درجة I وإكتئاب ثنائي القطب درجة II. يوصف بالإكتئاب ثنائي القطب درجة الواقعه زمنية كآية هوسيّة يتبعها واقعه زمنية كآبة واحدة على الأقل. ويُوصَف الإكتئاب ثنائي القطب

كيف تنشأ الكآبة النفسية؟

- الخلفيات الوراثية
- الجنس
- السن
- عوامل إجتماعية - إقتصادية مثل العطالة عن العمل والمستوى التعليمي المتدني
- عوامل إجتماعية - نفسية
- عوامل حيوية - عصبية
- قلة الضوء في مراحل السنة المعتمة (الكآبة الموسمية)
- الأمراض المزمنة
- الأدوية
- ردود الفعل الجسدية الوقائية على حالات ترتبط بالغروف وبالذنب أو بالحياة (في حالة الكآبة الحادة)
- الأمراض المرافقية (المشاركة)

يتم فيما يلي شرح العوامل بشكل أوضح. يجب التفكير هنا بامكانية ظهور كثير منها في آن واحد ويمكن أن تؤثر على بعضها بشكل متبادل. ولهذا فإن تأثيرها مختلف جداً من شخص لآخر.

لا يجد المصاب بالكآبة لنفسه شرحاً واضحاً بشكل دائم، لماذا هو مريض بالكآبة. فيفترض المختصون اليوم بأن تلاقي العوامل المتعددة يشارك سوية في نشوء الإلطفارات الكآبية. ونتيجة لذلك تؤدي شروط جسدية معينة (جزء منها هو الخلفيات الوراثية أيضاً) سوية مع حوادث وقيود سابقة إجتماعية وضارة ومرتبطة بالبيئة إلى إمكانية حدوث جرح (ضعف)، والذي يمكن مع الزمن أن يتم تقويته أكثر عن طريق تأثيرات سلبية حيوية وإجتماعية ونفسية مستمرة. يتم حالياً ربط الأسباب والمحرّكات وعوامل الخطورة التالية بنشوء أمراض إلكتئاب:



الخلفيات الوراثية

تم في كثير من الأبحاث العلمية الإثبات بأن الكآبة تظهر غالباً في عائلات الأقرباء من الدرجة الأولى والذين يعانون من الكآبة. تصل درجة خطورة الإصابة بالمرض من 10 % إلى 20 % عند الأطفال إذا كان أحد الأبوين مريضاً بالكآبة، أما إذا كان كلاً الأبوين مصاباً فترتفع درجة الخطورة إلى 60 %.

الجنس

تزداد إصابة النساء بالكآبة بشكل أكثر من إصابة الرجال. دلت الفحوصات على أن 15 % من النساء و 8 % من الرجال أصيروا بمرحلة كآبة خلال عام واحد. إذن تكون خطورة حدوث المرض عند النساء أعلى بضعفين تقريباً من الرجال، وتكون الفروقات بازرة أكثر عند الشباب الناشئين. كما تتعادل خطورة حدوث المرض مع تقدم العمر.

السن

يمكن أن تظهر الكآبة النفسية في كل مرحلة من العمر. لكن ترتفع إمكانية حدوث المرض بين سن الـ 30 إلى الـ 40 عاماً. وتزداد الإصابة بالمرض عند الشباب الناشئين بين سن الـ 18 إلى الـ 25 عاماً.

الوضع الاجتماعي - الاقتصادي

يوجد إرتباط بين الوضع الاجتماعي . الاقتصادي المتدني (الفقر وتدني المستوى التعليمي والعطالة عن العمل) وبين ظهور أمراض الكآبة النفسية. تكون العطالة عن العمل لفترة طويلة والفقر من العوامل الخطيرة الظاهرة. وبالعكس يمكن أن تؤدي الكآبة النفسية غير المعروفة، والتي ترافق تدني إمكانية المهنية إلى إقصاء المصاب عن سوق العمل.

العوامل النفسية - الإجتماعية

يمكن للمحيط الإجتماعي والعمل المهني وعادات الحياة أن تلعب دوراً مهماً في ظهور أمراض الكآبة النفسية. ترتفع خطورة الإصابة بمرض الكآبة النفسية عن طريق ما يسمى بـ "أحداث حرجية في الحياة"، مثل الطلاق وفرق الشريك أو موته. وبالإضافة لذلك فإن الأشخاص ذوي العلاقة العائلية الصعبة أو التواصل الإجتماعي القليل يصابون بشكل متزايد بالكآبة.

يمكن أن تكون الهجرة حدث حرج في الحياة ومرافقه لأعباء نفسية قوية أيضاً. يمكن أن يسهل نشوء الكآبة تشتققات البني العائليه والشعور بفقدان الجنود الإجتماعية والثقافية الذاتية وخبرات الإضطهاد والتمييز العنصري في البلد المقصود أو الصدمات النفسية عند اللاجئين من مناطق الحروب.

كما يمكن أن يحمي ايقاع الحياة اليومية المتوازن من الكآبة النفسية. غير أن كثيراً من الناس يعملون بوردية أو مناوبة ليلية ولا يستطيعون المحافظة على مراحل الراحة والنوم والإستيقاظ بشكل مستمر. لكن يمكن أن يسبب الضغط في وقت الفراغ وما ينتج عنه من نقص النوم في ظهور أمراض الكآبة النفسية أيضاً.

الإكتئابات النفسية الموسمية

تظهر عوارض الكآبة الموسمية فقط في الخريف والشتاء (بسبب قلة الضوء). يعاني في المانيا حوالي 800.000 إنسان من ما يسمى بالكآبة الموسمية. ويتم قبل كل شيء ملاحظة هذه الكآبة عن طريق فقدان النشاط وفقدان السرور ومزاجية منحطة ضاغطة. لكن بعكس "الكآبة التقليدية" يعاني المصابون أيضاً من الحاجة القوية إلى النوم والإحساس الزائد بالجوع المفاجئ.



الأمراض المرافقة (المشاركة)

يرجع حالياً فحوصات كثيرة تدل على ظهور إضطرابات كآبية مرتبطة غالباً بإضطرابات نفسية أخرى وأمراض جسدية (= الأمراض المرافقة). ويعاني 60 % من المرضى بالواقعة الزمنية الكآبة من إضطراب نفسي آخر.

إلى جانب الأمراض النفسية مثل اضطرابات الخوف ينضم للإضطرابات النفسية الأخرى أيضاً إضطرابات المرتبطة بالألم جسدية الشكل (كالإضطراب المؤلم) أو أمراض الإدمان (مثل الإدمان على الكحول).

يمكن للإضطراب الإكتئابي أن يظهر بوقت واحد مع أمراض مرتبطة بالجسد. ينضم لهذه أمراض عصبية أو هormونية وأمراض نظام القلب والدورة الدموية وكذلك أمراض السرطان والألم المزمنة.

الأمراض المزمنة كمسبب للمرض يمكن أن يسبب العديد من الأمراض المزمنة الكآبة النفسية. وبعد من هذه داء باركينسون، السكتة الدماغية، الصرع، السكتة القلبية، أمراض السرطان وداء السكري. يمكن أن تكون الاعتلالات الهرمونية مسببة للكآبة أيضاً، كما هو الحال أثناء وجود إضطراب في عمل الغدة الدرقية.

بأي شيء تُعرف الكآبة النفسية وكيف يمكن معالجتها؟

قبل أن يمكن للشخص أن يبدء بمعالجة الإضطراب النفسي، يجب أن يحصل في الخطرة الأولى التوضيح بشكل مطلق بوجود إضطراب نفسي (الأفضل عن طريق إختصاصي).

حتى يمكن منح التشخيص تسمية الكآبة النفسية، يجب أن يوجد إثنين من الأعراض التالية في النهار تقريرياً وفي كل يوم وعلى مدار فترة زمنية تدوم لمدة أسبوعين على الأقل:

- الإحساس بالحزن، والإكتئاب أو الأحساس غير الشفافة والواضحة.
- فقدان الاهتمام بالأشياء التي كانت تبعث السرور سابقاً.
- ضعف النشاط (ضعف التحفز)
- ارتفاع في إمكانية التعب

وغير هذا يجب أن يوجد إثنين من الأعراض التالية عند المصايبين على الأقل:

- تراجع في التركيز والإنتباه
- تراجع الإحساس بالقيمة الذاتية والثقة بالنفس
- الإحساس بالذنب وعدم القيمة
- تطلعات سلبية ومت麝ائمة حول آفاق المستقبل
- وجود أفكار بالإنتشار ووجود محاولات لها
- إضطراب النوم
- تدلي الشهية

من أجل فهم التأثير المشترك للعوامل الموصوفة، يجب على المرء أن يفهم كيف تجري متابعة تواصل المعلومات في داخل دماغنا. تتبادل الخلايا العصبية الفردية التي تتخلل جسdena ويتألف منها دماغنا المعلومات فيما بينها. ويمكن أثنا، هنا أن يتم تسجيل هذه المعلومات كتعابير الأحساس، كما هو الحال في تأمل لوحة أو سماع موسيقى. لكن يمكن أن يتعلق الأمر بالأحساس أو الأفكار، فيحدث متابعة نقل مثل هذه المعلومات بين الخلايا الفردية للدماغ عبر إفراز مواد ناقلة تسمى المواد الناقلة العصبية. نتائج الأبحاث الحالية تدل على إضطراب الإستقلاب في الدماغ أثنا، الكآبة، وقبل كل شيء، فقد المواد الناقلة كالسيروتونين والنورأدرينالين توازنها. كما تتفقد القدرة على الإحساس بالشعور مثل الفرح أو القناعة عن طريق هذا الخلل الإستقلالي؛ وتفرض الأحساس السلبية سيطرتها القوية.

يمكن أن يكون سبب هذه الإضطرابات الإستقلالية قد تم عبر عوامل كثيرة، كما ذكر من قبل. مثل هذا الحديث يمكن أن يكون بإنتقال إلى مدينة غريبة. وأن تكون مشاكل الحياة مسببة لهذا الإضطراب أيضاً: فقدان الشرير، أو موت أحد الأقرباء أو إستمرار التكليف فوق الطاقة أو تقليله. لكن يوجد أناس يصابون بمرض الكآبة أيضاً وليس لديهم أية مشكلة على ما يبدو. فيحصل عندهم عدم توازن المواد الناقلة في الدماغ بدون أي حدث يعرف.

بالرغم من وجود حق المعالجة بطرق العلاج النفسي أيضاً، وذلك بعد إثبات التشخيص الواضح لمرض الكآبة النفسي، فيجب الأخذ في الحسبان أحياناً بحصول إنتظار طويل حتى تبدء المعالجة!

يمكن في حالة الكآبة الخفيفة وفي ظروف معينة أن تكفي المعالجة في عيادة طبيب نفسي مرخص له بمزاولة المهنة أو معالج نفسي، لكن يجب أن تتم المعالجة في حالة الكآبة القوية بالأدوية والمعالجة النفسية في وقت واحد وبمستويات مختلفة في أغلب الأحيان. فبهذا الشكل تتم المحاولة لمنع إزدياد سوء الحالة أو تحولها إلى حالة ترانسنية وتحفييف الآلام النفسية التي تعذب المريض. ويجب أن لا تتوقف المعالجة فجأة، حتى ولو ظهر إحساس بالتحسن.

يتم في البداية تقرير أي شكل من المعالجة يمكن أن يساعد ويوزن دوافع المريض. في الوقت الذي يصف فيه الطبيب. المقصود هنا الطبيب النفسي. الأدوية كخبر بها، يمكن أن يقوم المعالج النفسي بالتعاون مع المصاب بتتصميم إستراتيجية المعالجة من أجل كشف وقائع نفسية ممكناً غير مقصودة ومهمة للمرض أو للتعامل مع الكآبة. ويتم في العادة التكلم عن الأحوال الشخصية والمهنية وكذلك المخاوف الحالية.

فضلاً عن ذلك يمكن أيضاً أن يرافق الإضطرابات النفسية آلام في الرأس أو آلام أخرى ومتاعب جسدية وإضطرابات في الهضم وإضطرابات جنسية وفقدان الأمل والخوف والهم.

تلاشى أحياناً أمراض الكآبة خلال أيام أو أشهر بشكل تلقائي، ويمكن أن يستمر الأمر أيضاً سنة أو أكثر، كما يمكن أن تظهر أمراض الكآبة لأكثر من مرة.

تجلب الكآبة النفسية للمصابين بها ولأقربائهم ضغط إنتاج عال وتجسم عيناً ثقيلاً بشكل مستمر. من أجل هنا يجب التفكير بالمعالجة المبكرة جداً، لأنه يوجد في الوقت الحالي سلسلة طرق لمعالجة الكآبة النفسية بشكل فعال.

عند ظهور متاعب صحية يجب أن توصل الخطوة الأولى إلى طبيب الأسرة، لكن يتم في الغالب إكتشاف أمراض الكآبة بشكل متأخر. وهذا يجب دائماً الاستعانة بطبيب متخصص إلى جانب طبيب الأسرة أيضاً من أجل تشخيص دقيق لها. يقوم الطبيب في حالات الإضطرابات النفسية في البداية بفحص ما إذا كان هناك مرض عضوي. يمكن أن يفحص طبيب الأعصاب المريض فيما بعد بشكل مقصود، لمعرفة ما إذا كان هناك أمراض محتملة للعضلات والجهاز العصبي. إذا تم التأكد بعد وجود أية أسباب عضوية واستمرت المعاناة، فيحيل طبيب الأسرة المريض إلى طبيب نفسي أو معالج نفسي.

تم تأكيد مفعول ثلاث طرق أثناء معالجة الكآبة:
المعالجة النفسية المؤسسة على التعمق النفسي
(العقل الباطني) والمعالجة النفسية التحليلية والعلاج
السلوكي.



المعالجة النفسية المؤسسة على التعمق النفسي والمعالجة النفسية التحليلية

يحاول المعالج في هذين الشكلين من العلاج بالتعاون مع المريض تطوير رؤية لكيفية شفاء الإضطراب النفسي عند المريض. إنها تساعد على فهم الأسباب الأعمق لإضطراب النفس هنا ("لماذا يحصل عندي إضطراب في النوم وألام الرأس ولم أكون قادر الجرأة؟") والسماح بالأحساس (مثل الخوف والحزن والغضب). فالأساس هو الفرضية بأنه يتم تطبيع كل إنسان في شخصيته عبر التربية والظروف المعيشية والثقافة. عندما يفهم الشخص أولاً لماذا ينسحب بدل أن يفرض نفسه (ومن ذلك سبب رفض يخاف منه وتجنب الشجار)، فيمكن للمرء أن يتعلم كيفية تمثيل إهتماماته بالشكل الصحيح ويشعر بأنه ليس مكتئباً وليس رخيص القيمة. يتم بالتعاون مع المعالجين التحقق من الحوادث والصراعات التي جرت مع المصاب في حياته، والتي يمكن أن تكون قد أدت إلى شفاء

بغض النظر عن قوة وسبب الأمراض الإكتئابية. يتعلق الأمر في المحادثات العلاجية بعد ذلك بأن يجسد المصاب حياته خطوة بخطوة. وينضم له هنا أيضاً التعامل مع الأفكار والتصرفات السلبية الضارة بالنفس. يمكن بالمحاداة مع هذا أن يتم التمهيد لنشاطات عدة في المجال الخاص ومجال العمل عن طريق المربين الاجتماعيين والمختصين في التربية الإجتماعية أو مهن إختصاصية أخرى أو عبر المساعدين المختصين. فتزداد هنا أيضاً أهمية عروض الحركة والتعبير الخالق. كما تكون مثل هذه المساعدة الإحترافية المتعددة الأشكال مجتمعة مع العلاج بالمحاكاة ويمكن الإتصال مع مصابين آخرين في قسم من مشفى متخصص بالإضطرابات النفسية، ويكون أفضل شيء أن يتم في قسم متخصص بعلاج الكآبة النفسية.

ينصح بالإقامة في أقسام مشفى متخصص في كل حالة مرض كآبة تؤدي إلى التزعزع القوي الواضح للعلاقات مع الأشخاص الآخرين أو في المهنة، و يؤدي بهذا إلى سوء نوعية الحياة . ولكن أيضاً في حالة ظهور أفكار بالانتحار.

طرق المعالجة النفسية

المعالجة النفسية هي مصطلح شامل ي عدد كبير من طرق المعالجة. إنها تشتهر بأن ينبع للمرض على أنه مشكلة ويمكن للمصاب أن يشارك في حلها شخصياً. تخدم المعالجة بطرق العلاج النفسي من جملة الأمور التوصل إلى أسباب المرض التي ليس لها طبيعة جسدية ومعالجتها، ويجب دائماً أن يتم العمل بها بمرافقه المعالجة الدوائية أيضاً.

الأدوية

يمكن لمواد ناقلة معينة في جهازنا العصبي المركزي أن تقع في فقد ترتيبها أثناء مرض الكآبة، وتنقص المواد الناقلة أو تكون غير متوازنة بشكل كاف. تقوم الأدوية الفعالة المضادة للكآبة بجعل توازن المواد الناقلة متذلاً ويمكن أن تساعد المصابين بهذا. لكنها للأسف يمكن أن تسبب تأثيرات جانبية غير مرغوب فيها. مثل الأدوية الأخرى أيضاً. لهذا يخاف كثير من الناس من تناول هذه الأدوية أيضاً لأنهم يخشون أن يصبحوا مدميين عليها. توجد حالياً أدوية لكنها جديدة وذات تأثير نوعي أفضل وفعالة، ويمكن تجنب بعض التأثيرات الجانبية. مثل الإدمان.

تلقي الأطباء المختصون في الأمراض النفسية تدريباً إختصاصياً في هذا المجال وهم يعلمون كيف تؤثر الأدوية وأية تأثيرات جانبية للأدوية يمكن ظهورها. لذلك يجب على المصابين دائمًا أن يطلبوا الإستشارة والعلاج من الطبيب النفسي في حال إستعمال الأدوية، كما يجب أيضًا أن لا يتم التوقف مطلقاً عن تناول الأدوية قبل التكلم مع الطبيب، لأنه يمكن للحالة النفسية أن تسوء من جراء هذا. عدا ذلك فكثير من الأدوية عندها ما يسمى بالرمن المستتر، هذا يعني بأن الأمر يحتاج لفترة زمنية معينة (عند بعض المستحضرات ما بين الأربعين إلى ستة أسابيع) حتى يشعر الشخص بتأثير الدواء. ومن المهم جداً أن لا يتم وقف تناولها في هذا الوقت، حتى ولو لم يظهر إحساس فوري بالتحسن.

الإضطراب النفسي. يتم التخمين بأن هذه التجارب قد حدثت أثناء الطفولة على الأغلب. ففي الوقت الذي يظهر فيه الحدث، الحالي في المعالجة النفسية المؤسسة على التعمق النفسي إلى الواجهة، يركز التحليل النفسي بشكل أقوى على الأحداث السابقة في حياة المريض. وعدا عن ذلك، فإن زمن المعالجة يكون في الطريقة الأخيرة أطول بشكل ملحوظ.

العلاج السلوكي

يهدف العلاج السلوكي عبر المحادثات والتمارين والرؤى الجديدة لمعرفة وتغيير طرق السلوك الإشكالية (مثلاً: الشك المطلق أو التفكير السلبي القوي جداً)، والتي يمكن أن تكون ملزمة لسبب المرض. كما يشكل التقى التوضيحي لطريقة التفكير الإشكالية وتغييرها وتمكين أو تغيير طريقة السلوك أهدافاً أساسية للمعالجة.

طرق علاجية أخرى ضد الكآبة

يصلح عدد كبير من الإجراءات لدعم علاج الكآبة، والتي يمكن أن يطور المصابون بعضاً منها عن طريق التعاون مع المعالجين. يعد من هذه الطرق الحركة الكافية والطعام الصحي وإمكانيات الإستشارة أثناء المشاكل الاجتماعية والمهنية في مؤسسات أخرى، لكن الدعم للتعامل مع الدوائر الرسمية والمسؤولين أيضاً، وكذلك الحث على القيام بالنشاطات الإجتماعية أو تعلم تمارين الإسترخاء، التي يمكن أن تكون ذات فائدة أيضاً.

يمكن للخدمة الاجتماعية أن تساعد في إستشارات حول المشاكل البيروقراطية والإجتماعية المتعددة أثناء الإقامة للعلاج في أقسام المشافي. كما يمكن أن يكون العلاج الفصوئي وعلاج الحرمان من النوم من الإجراءات العلاجية الأخرى.

إذا كان التفاهم في اللغة الألمانية غير ممكن أو صعب جداً، فيمكن أن تكون المعالجة ضرورية عن طريق معالج يتكلم لغة الأم لتفادي سوء التفاهم غير الضروري وعدم الفسر بنجاح المعالجة. يمكن أيضاً الاستعانة بمترجم يرافقت مرحلة العلاج كبديل لهذا. لكن عليه أن يكون ممتعاً بالكفاءة لهذه الوظيفة. ويجب، إن أمكن، أن لا يقوم الأقرباء أو الأصدقاء بالترجمة، لأنه تظهر صراعات و / أو إحساسات بالخجل الشديد من مواضيع معينة، والتي يمكن أن تؤثر سلبياً على المعالجة.



يجب الإنتماه وخاصة في بدايةتناول الأدوية بأن مراقبة طبيب لهذا ذات أهمية خاصة. يمكن في بعض الحالات أن يزداد نشاط المصاب في البداية، وذلك بسبب تأثير الدواء، بالرغم من أن الحالة المزاجية لم تتحسن بعد بشكل مبدئي. إن الميول للانتحار يمكن أن تزداد بهذه، فيجب الإنتماه المطلق إلى العلامات التي تشير إليها (مثل الإنغلاق الواضح، وأشكال العنف الواضح ضد الشخص نفسه، ومقولات خيالية حول الانتحار وقصده)!

اللغة والتفاهم الثقافي أثناء العلاج
يكون التفاهم الجيد وال العلاقة ذات الثقة الكاملة بين المعالج والمريض مهمان جداً في المعالجة بطرق العلاج النفسي ويشكلان أساساً لمعالجة ناجحة. كما تلعب اللغة المشتركة هنا دوراً مهماً جداً من أجل أن يتم التواصل بدون أية مشاكل وأن التفاهم يمكن أن ينشأ.

وفضلاً عن ذلك، يكون مهماً أثناء معالجة الأمراض النفسية أن يحوز المعالج على مستوى كافٍ من فهم الخلفيات الثقافية (مثل الدين) وتاريخ الهجرة والبنية العائلية ومحيط حياة المريض. فهذا الأمر هو حد الفصل، لأنه يمكن أن يوجد مثلاً في كثير من مناطق العالم مفهوم مختلف جداً عن المرض بشكل عام وعن الكآبة النفسية بشكل خاص، أو أن يتم تسميتها بشكل مختلف تماماً. ويمكن أيضاً أن تكون الإضطرابات النفسية في بعض المجتمعات شيئاً يتم كبته وأن يكون عند المصابين في البداية خوف كبير من التكلم عن مرضهم. وبالعكس فإنه ذو أهمية كبيرة للمريض، بالنظر إلى سير العلاج، أن يفهم بشكل صحيح ما يقوله المعالج له وأن يمكنه إعلام المعالج عن حاجاته وهمومه.

ماذا يمكن أن يفعله الأقرباء والأصدقاء والمصابين؟

إذا كنتم تعيشون مع مريض مكتتب في سكن مشترك، فانصحوه برفق بالإستعانة بمساعدة إحترافية من طبيب نفسي أو معالج للأمراض النفسية، أما إذا كان المريض يخضع للمعالجة فعليكم الانتباه إلى تناوله لأدويته بشكل منتظم والتزامه بمواعيده الطبيب أو المعالج النفسي. لكن لا يعني هذا أنه عليكم التجسس على صديقكم أو قريبكم أو أن تقوموا بالوصاية عليه. من يمرض بالكابة يميل إلى عدم الإعتقاد بشفائه ويشعر في ظروف معينة بأن الإلتزام بمواعيده الطبيب يشكل عبئاً كبيراً عليه. فيمكن للأصدقاء، وأفراد العائلة أن يقدموا هنا المساعدة بشكل أبيي مرتفع. كما يمكن في ظروف معينة - وبعد التكلم مع المصاب والمعالج - أن توجد مشاركة للأقرباء في العلاج.

يصعب حث الشخص المكتتب على القيام بأي نشاط ما. يشكل الإستيقاظ الصباحي وإرتداء الملابس عقبة كبيرة، ويمكن أيضاً أن يقدم الأقرباء والأصدقاء المساعدة النافعة في هذه الحالة، وذلك بدعم المريض للقدرة على استعادة تنظيم أعماله اليومية. لكن يجب هنا أيضاً أن لا يسفر عن هذا الدعم نوع من الوصاية عليه أو لومه. فإذاً إمكانيات المساعدة تكون مثلاً في ترتيب موعد ثابت من أجل نزهة مشتركة سيراً على الأقدام.

عدم تحميم المصاب فوق طاقته هي القاعدة المهمة أثناء دعم الأقرباء أو الأصدقاء. يجب على المريض في بداية المرض أن يتعلم أيضاً بأن يترك نفسه تسقط وأن يقبل بضعف نشاطه.

يمكن للأقرباء والأصدقاء أن يدعموا المريض بالكابة. غير أنه ليس من السهولة ودوماً أن يتم في حالة الإكتتاب التعرف فوراً على ما يساعد المصابين ومتي وما الذي لا يساعدهم.

المقياس الحقيقي للدعم يكون الأمر صعباً على العائلة أو مجموعة الأصدقاء وبصورة متكررة أن يضعوا مرض الكابة في الموضع الصحيح. في الغالب لا يفهمون لماذا يفقد الشخص المعنى الطاقة والإهتمام، ولا يشعر بالفرح، ويرغب بالبقاء لوحده فقط أو يرد بعنف أو بعدم الهدوء. يحس الأشخاص القادمون من مجتمعات متترمة عائلياً بشكل خاص وفي أغلب الأحيان بالإرتباط القوي مع المريض ويشعرون بأنهم ملزمون بدعم فرد الأسرة المكتتب. يظهر هذا مثلاً عن طريق أشكال التصرف مثل الزيارات الكثيرة والمتعلدة أو الطلب الذي يتم التعبير عنه "بأن يتم شفائه أخيراً". ويمكن لهذا أن يضع المريض النفسي تحت ضغط إضافي ويكون عقبة في وجه الشفاء. يمكن أن يسبب شكل ظهور مرض الكابة هذا ارتكاكاً أيضاً أو رضاً، لأنه غير معروف عند الكثير من الناس.

إذاً أردتم أن تشاركونا كتربيب أو كصديق في التوعية عن المرض، فتكلموا مع معارفكم حول موضوع "الكابة". أظهروا تفهمكم لوضع المريض. لا تحاولوا أن توضحو للمصاب بالمرض بأن حياته ليست سيئة إلى هذا الحد أو أنه يوجد أناس حالتهم أسوء منه. مثل هذه المحاولات لمنح المريض النشاط . والتي يقصد منها غالباً شيئاً جيداً. تقوي عند المريض المكتتب للإحساس بفشلاته فقط وعدم قدرته على إمكانية السيطرة على حياته.

يمكن للمصابين أن ينشطوا أيضاً
ويستطيع المصابون أن يفعلوا شيئاً ما بأنفسهم، مثل
القيام بتنظيم وإلقاء "تقدير الحالة المزاجية" عندهم.
كما يميل الأشخاص المكتئبين إلى الرؤية المتشائمة
(السوداء) لكل شيء. حتى لو تم نجاح بعض الأمور
في الحياة اليومية، ورأى بعض الأشخاص ميلاً لنوع
من التحسن الظاهري، فالمكتئب يشعر بشكل مستمر
بأن كل شيء مخيف وعديم الأمل. في هذه الحالة
يساعد المريض نفسه بأن يقيّم وضعه الصحي اليومي
لعدة مرات ويدرس النتيجة. فتنظيم وإلقاء مثل
"تقدير الحالة المزاجية" هذا يعكس تلك النفسية
بعينكم أمام المرأة، ويتورث على دفع الغطرس بأن
النّظر إلى الماضي تُظهر أخذ كل شيء بشكل سليبي.
التدوين المنتظم للنظرية العامة يسهل بنفس الوقت
تقدير الطبيب لمستوى تقدم المعالجة (تجدون
مثالاً للإستدلال عن مثل هذا التقديم في ملحق
دليل الإرشاد هذا).

كيف يمكن الإستمرار بهذا؟

يلخص هذا الدليل الإرشادي الموجود بين أيديكم
المعلومات الأساسية عن موضوع الكآبة النفسية،
ويريد أن يجعل الإنتماء لهذا الموضوع ويخدم
كنقطة إطلاق أولى للأشخاص الغربيين بتقييم
تضوحي لهذا الموضوع، وذلك لأنهم مصابون بذلك
أو أحد أقربائهم بهذا المرض أو أنهم مهتمون به
لأسباب أخرى. لكنه لا يعرض مطلقاً عن الإستشارة
أو المعالجة عن طريق الخبراء! ولذا يكون من المهم
أن تتصلوا أنتم كمصابين به أو أقربائهم بالإدارات
المختصة أو المعالجين وتحصلوا على المساعدة.
فيما إذا لاحظتم بأنه توجد عندكم مشكلة. يمكن أن
تعطي العناوين الموجودة في القسم الأخير من هذا
الكتيب إستدلالاً أولياً.

التعامل مع التفكير بالإنتشار ونواياه
يرافق الكآبة القوية خطورة كبيرة بالإنتشار بشكل
 دائم. خذوا دائماً تلميحات المريض عن هذا الأمر
 بجدية! يتم غالباً الإعلان عن الإنتحار قبل حصوله.
 لا تحاولوا ثني المكتئب عن فكرة الإنتحار. حتى لو
 إبتعد صديقكم أو قريبكم عن أفكار الإنتحار أمامكم،
 فيمكنها أن تعود خلال فترة وجيزة. أعطوه الفرصة
 الكافية لأن يتكلم عن هذا ما يستطيع. يجب على
 من يعاني من الكآبة أن يحصل على الإمكانية بشكل
 دائم بأن يستطع التكلم مع شخص آخر. لا يمكن أن
 يتم التغلب على الكآبة مع ما يصاحبها من عوارض
 مرضية كثيرة يمكن التغلب عليه بالقدرة الذاتية.
 أخبروا الطبيب المعالج عن حالة المريض المصاب.
 تكلموا بشكل جلي مع المصاب بأنه من المهم جداً
 أن يتكلم هو أيضاً مع المعالج عن أفكاره بقتل نفسه،
 وذلك ليتمكن البحث سوية عن حل لهذا في إطار
 المعالجة.

التفكير بالذات

يجب الانتباه ليس فقط إلى تحمل المصاب فوق
 طاقته، بل أيضاً إلى إرهاق من يساعد له. يجب على
 من يريد أن يقف إلى جانب إنسان مريض بالكآبة
 كصديق أو قريب أن يعلم بوضوح عن إمكانيات
 تحمله أعباء ذلك ويتطلب أن لا يغيب مطلقاً عن
 باله سعادته الذاتية. غالباً ما يدور الحديث مع
 الإنسان الذي يعنيه من الكآبة حول المرض ذاته
 فقط. فهذا يشكل غالباً عبئاً كبيراً على الصديق أو
 الأقرباء، والذي يجب أن لا يتم التساهل به. عليهم
 إيجاد الأجزاء العبرة التي تستطيعون فيها القيام
 بنشاطات أخرى. توجد أيضاً إمكانية أخرى كالبحث
 مع الأقرباء الآخرين عن حديث في مجموعة
 المساعدة الذاتية للأقرباء، والذي يُنصح به بقوة في
 حالة الإكتئاب الشديد. يمكن هنا أن يتم تبادل
 الأفكار مع بعض وإعطاء الإقتراحات المهمة والنصائح
 بشكل متبادل.

قاموس صغير

إضطراب إكتئابي مزاجي جزئي (الكآبة النرجسية)
يوصف الإضطراب الإكتئابي المزاجي الجزئي بمرض الفيقي النفسي (الإضطراب) المزمن المستمر لمدة عامين على الأقل.

إضطراب مرتبط بالألم جسدية الشكل
هو أمراض لا يستدل منها بوضوح بارتباط المتابع الجسدي بمرض جسدي، إنما تكون لها أسباب نفسية واجتماعية أو حيوية متعددة.

إضطراب ثنائي القطب
مراحل الكآبة النفسية ومراحل الهوس تتبادل زمياً مع بعضها، بينما يظهر إلى الأمام إنعدام الحركة (الكسل) في مرحلة الكآبة، وتكون حالة الفرح المزاجي المبالغ فيها مميزة لمرحلة الهوس.

إضطرابات الخوف
مصطلح شمولي لمجموعة من الإضطرابات التي تترافق مع إحساس حاد أو مستمر بالخوف. يمكن أن يتعلق هذا الخوف هنا بحالات أو أماكن معينة، أو أن يكون غير نويعي.

إضطرابات نفسية (عاطفية التأثر)
مجموعة من الإضطرابات النفسية تتصف أساساً بتغيير مرضي للحالة المزاجية (التأثر).

أمراض مرافقة (مشاركة)
تظهر الأمراض المرافقة (المشاركة) بشكل إضافي أثناء المرض الأساسي ويمكن أن ترتبط به.

داء باركينسون

◀ مرض عصبي مزمن يرافقه موت الخلايا المولدة لمادة ▲ الدوبلين. من إحدى نتائجه إرتجاف العضلات الذي لا يمكن التحكم به وتنباطي الحركات.

تحليل نفسي
شكل من أشكال المعالجة يتم فيه توعية المريض حال العرادات المستمرة والمؤثرة التي كانت في السابق ولم يتم إيجاد حل لها. تطورت تعاليم التحليل النفسي في نهاية القرن التاسع عشر من قبل خبير علم الأعصاب سيموند فرويد.

تزامن
عمل يحدث فيه تطور حالة المرض الحاد إلى مرض مستمر (مزمن).

جهاز عصبي مركزي (=الجهاز المركزي للأعصاب)
جزء من الجهاز العصبي يتتألف من الدماغ والنخاع الشوكي.

خبير في علم الأعصاب
يسمي بالعامية طبيب أعصاب وهو طبيب تخصص بالأمراض العصبية. إنه مختص بالجهاز العصبي والعضلي.

خبير نفسي
هو من درس علم النفس (دبلوم في علم النفس، أو ماجستير في علم النفس).

دوبامين

مادة ناقلة يتم إستخدامها كدواء أيضاً. تكون إحدى مسؤولياتها تنسيق الحركات والشعور مثل الخوف أو السرور في الجسم. وتسمى باللغة العالمية أيضاً "هورمون العظ".

عصبي
ما يتعلق بالاعصاب.

عضوي
ما يتعلق بالأعضاء.

غدة نخامية
تسمى أيضاً بالغدة المعلقة بالدماغ. وهي عضو ينظم أعمالاً مهمة في الجسد عن طريق إفراز الحالات (الهرمونات).

الكابة النرجسية
= الكابة الجزئية

كابة نفسية ذات القطب الواحد
الكابة النفسية بدون مراحل الهوس.

كورتيزونات سكرية
المعروف باللغة العالمية بالكورتيزون. يتم إنتاج الكورتيزونات السكرية كحادة (هورمون) في الغدة الكظرية فوق الكلية وتأثير خاصة على نظام القلب والدورة الدموية وعلى الإستقلاب الخلوي والجهاز العصبي، كما تم إثبات مفعولها كمثبط للالتهاب.

مادة ناقلة
وتسمى أيضاً مواد ناقلة عصبية. مواد الجهاز العصبي المركزي التي تخدم نقل الإشارات أو المعلومات ضمن الكائن الحي.

مادة ناقلة عصبية
انظر: مادة ناقلة.

متكرر (إنتكاسي)
يعود للظهور

زمن مستتر

توصف هذه العلاقة بالزمن الذي يمكن أن يمر بين مرحلة تناول الدواء والإحساس ببداية تأثيره.

سيروتونين

مادة ناقلة / مادة ناقلة عصبية؛ تؤثر خاصة على نظام القلب والدورة الدموية وعلى قناة المعدة والأمعاء وعلى الحالة المزاجية. يتم تعليل الإضطرابات الكابية غالباً بنقص مادة السيروتونين.

صدمة (رفخ) (جمع: صدمات)

حدث فاصل وغالباً مطلق العنف (مثل الحادث والإغتصاب أو الكارثة الطبيعية)، والذي يمكن أن يؤدي إلى جرح في النفس كنتيجة له وإلى إضطرابات نفسية.

طبيب الأسرة

هو طبيب تخصص في الطب الداخلي أو الطب العام ومسحوم له قانونياً بمزاولة مهنته بشكل حر، يكون غالباً أول نقطة إتصال في حال حصول المشاكل الصحية.

طبيب نفسي

طبيب تخصص بالأمراض النفسية. يحق له أن يشخص المرض ويصف العلاج بالأدوية ويبحث في الأمراض النفسية.

عارض

إشارة تدل على مرض أو جرح.

متلازمة الإرهاق

والمعروفة أيضاً "بالشخص المحروق". حالة إنهاك مع وجود ضعف الإنتاج الفعلى بسبب الفحص المهني أو الإجهاد الناتجي المستمر.

أسباب الإرهاق
عوامل داخلية وخارجية تسبب حالة تعب جسدي ونفسي عالٍ (إرهاق).

مضادات الذهان، مهدئات عصبية
أدوية تستعمل لعلاج إضطرابات نفسية معينة.

معالج نفسي
معالج نفسي خبير بالعلاج النفسي = خبير نفسي
حصل على تدريب إضافي كمعالج لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات، إنه يطبق طرق المعالجة النفسية حضراً.

طبيب ومعالج نفسي = طبيب حصل على تدريب إضافي في مجال المعالجة النفسية لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات. يوجد أيضاً في مجال المعالجة النفسية للأطفال والشباب مربين اجتماعيين ومحترفين في التربية الاجتماعية ومهن اجتماعية أخرى، بحيث يمكن أن يصبحوا عالجين نفسيين للأطفال والشباب بعد تلقיהם تدريباً إضافياً.

معالجة نفسية
مصطلح شمولي لعدة طرق معالجة نفسية لمشاكل النفس دون إستعمال الأدوية.

نفسي - إجتماعي
تسمى العوامل الاجتماعية (مثل نقص الاندماج) بالعوامل النفسية - الاجتماعية، والتي تؤثر على الحالة النفسية.

نورأدرينالين
مادة ناقلة / مادة ناقلة عصبية أو هورمون الإجهاد الذي يفرز من الغدة الكظرية فوق الكلية. يتم إستعماله كدواء أيضاً.

متلازمة الفص الجبهي الدماغي

أعراض تظهر لضرر في أجزاء الفص الجبهي من الدماغ، ومن بينها إضطراب التفكير لحل المشاكل وتنظيم الأحساس أو إنعدام النشاط الحركي (الكسل).

مجموعة المساعدة الذاتية

تتألف مجموعات المساعدة الذاتية من أشخاص يجب عليهم التعامل مع حالات أو مصاعب متشابهة مثل الأمراض المزمنة. يخدم اللقاء في المجموعات تبادل الخبرات واعطاء المعلومات والتشجيع المتبادل على الجرأة.

مرض / إضطراب كابي نفسي هوسي
انظر: إضطراب ثنائي القطب.

مرض السكري (= معناه اللغوي التدفق المعدل) ويسمى أيضاً داء السكري. هو مرض إضطراب التمثيل الغذائي، والذي ينتج عنه إزدياد مستوى السكر في الدم بشكل لا يمكن السيطرة عليه بسبب نقص الإنسولين (هورمون موجود في الجسم).

مرض الصرع
هو مرض عصبي مزمن مع نوبات تشنج تحدث فجأة بدون أسباب معروفة وواضحة، كما هو الحال في الصدمة الكهربائية.

مزمن
مستمر لوقت طويل أو متتطور بشكل بطيء.

هوس

إضطرابات نفسية (عاطفية) تسير غالباً بشكل مراحل وتصف بمعنيات عالية قوية وعدم الراحة الداخلية، وتصل إلى فقدان الإدراك بالواقع.

هوس ضعيف

شكل ضعيف من الهوس يصعب في أغلب الأحيان إكتشافه.

عنوانین

Bayerischer Flüchtlingsrat
Büro München
Augsburger Straße 13
80337 München
هاتف: 089 / 76 22 34

Büro Nürnberg
Humboldtstraße 132
90459 Nürnberg
هاتف: 0911 / 99 44 59 46
kontakt@fluechtlingsrat-bayern.de
www.fluechtlingsrat-bayern.de

Bayerischer Landesverband
Psychiatrie-Erfahrener e.V.
Glückstraße 2
86153 Augsburg
هاتف: 0821 / 450 478 63
kontakt@baype.info
www.psychiatrie-erfahrene-bayern.de

Bayerisches Zentrum für
Transkulturelle Medizin e.V.
Landshuter Allee 21
80637 München
هاتف: 089 / 189378760
info@bayzent.de
www.bayzent.de

Bayerisches Staatsministerium
für Gesundheit und Pflege
Haidenauplatz 1
81667 München
هاتف: 089 / 540233-0
poststelle@stmpg.bayern.de
www.stmpg.bayern.de

Bayerisches Zentrum für Prävention und
Gesundheitsförderung im
Bayerischen Landesamt für Gesundheit und
Lebensmittelsicherheit
Pfarrstraße 3, 80538 München
هاتف: 09131 / 6808-4510
ZPG@lgl.bayern.de
www.zpg-bayern.de

Bayerische Landeskammer der
Psychologischen Psychotherapeuten und der
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten
Birketweg 30
80639 München
هاتف: 089 / 515555-0
info@ptk-bayern.de
www.ptk-bayern.de

exilio Hilfe für Flüchtlinge und Folterüberlebende e.V.
Reutinerstraße 5
88131 Lindau
08382 / 409450 **هاتف:**
info@exilio.de
www.exilio.de

DTPPP – Dachverband der transkulturellen Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik im deutschsprachigen Raum e.V.
Dr. med. univ. Solmaz Golsabahi-Broclawski
Postfach 2622
D-59016 Hamm
sekretariat@dtppp.com
www.transkulturellepsychiatrie.de

Gesellschaft für türkischsprachige Psychotherapie und psychosoziale Beratung e.V.
Hüseyin Yüksel
Humboldtstraße 13
58511 Lüdenscheid
gtp@akpt.de
www.gtp-akpt.de

Deutsch-Russische-Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik e.V.
c/o Prof. Hans-Jörg Assion
LWL-Klinik Dortmund
Marsbruchstraße 179
44287 Dortmund
hans-joerg.assion@wkp-lwl.org
www.drgppp.lwl.org

Kassenärztliche Vereinigung Bayerns Landesgeschäftsstelle
Hausanschrift: Elsenheimerstraße 39
80687 München
Postanschrift: 80684 München
هاتف: 089 / 57093-0
info@kvb.de
www.kvb.de

Deutsch-Türkische Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und psychosoziale Gesundheit e.V.
c/o PD Dr. med. Meryam Schouler-Ocak
Psychiatrische Universitätsklinik der Charité
im St. Hedwig-Krankenhaus
Große Hamburger Straße 5–11
10115 Berlin
هاتف: 030 / 2311-2123
meryam.schouler-ocak@charite.de
www.dtgpp.de

Krisendienst Mittelfranken – Hilfe für Menschen in seelischen Notlagen
Hessestraße 10
90443 Nürnberg
هاتف: 0911 / 42 48 55-0
info@krisendienst-mittelfranken.de
www.krisendienst-mittelfranken.de

Deutsch-Türkische Medizinergesellschaft Bayern e.V.
Allersberger Straße 81
90461 Nürnberg
هاتف: 0911 / 476363
www.dtm-bayern.de

Psychologischer Dienst für Ausländer Caritasverband der Erzdiözese München und Freising e.V.

Bayerstraße 73, 2. OG

80335 München

هاتف: 089 / 231149-0

pda@caritasmuenchen.de

www.czm-innenstadt.de

Psychologischer Dienst
Beratungsdienste der Arbeiterwohlfahrt
München gemeinnützige GmbH

Goethestraße 53

80336 München

هاتف: 089 / 544247-53

هاتف: 089 / 544247-62

psych.migration@awo-muenchen.de

www.awo-muenchen.de

REFUGIO München
Rosenheimer Straße 38
81669 München
هاتف: 089 / 9829570
office@refugio-muenchen.de
www.refugio-muenchen.de

عناوين صفحات الشبكة المفيدة (الإنترنت)

www.bitte-stoer-mich.de

www.deutsche-depressionshilfe.de

www.buendnis-depression.de

www.dgbs.de

Landeshauptstadt München

Referat für Gesundheit und Umwelt Fachstelle

Migration und Gesundheit

Bayerstraße 28 a

80335 München

هاتف: 089 / 23347928

fachstellen.rgu@muenchen.de

www.muenchen.de

Landesverband Bayern der
Angehörigen psychisch Kranker e.V.

Pappenheimstraße 7

80335 München

هاتف: 089 / 51086325

lvbayern_apk@t-online.de

www.lvbayern-apk.de

Landeszentrale für Gesundheit in Bayern e.V.

Pfarrstraße 3

80538 München

هاتف: 089 / 68080-4500

info@lzg-bayern.de

www.lzg-bayern.de

open.med

Geschäftsstelle München

Leopoldstraße 236

80807 München

هاتف: 089 / 4523081-0

info@aerztederwelt.org

www.aerztederwelt.org

تقويم الحالة المزاجية

ما الذي قمت به من أجل أن تغيير حالي المزاجية وما الذي ساعدني على ذلك (مثل الحركة، الموسيقى، المحادثات، الأدوية ...)	حالتي المزاجية	ما الذي سبب حالي المزاجية؟ (مثلا: الطقس، نقص النوم أو سوء النوم، الصدمات، الإرهاب ...)	الوقت اليومي	التاريخ
ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ	ـ	ـ

ملاحظات

شكر وتقدير

نقدم الشكر من قلبا للسيدات والساسة الذين قدموا الدعم
الإخلاصي أثناء تصميم وكتابة هذا الدليل الإرشادي:

Dr. med. Solmaz Golsabahi-Broclawski
طبيبة مختصة بالأمراض النفسية ومعالجتها

Sabine Kirschnick-Tänzer
طبيبة مختصة بالأمراض النفسية ومعالجتها

Prof. Dr. Jan Ilhan Kizilhan
خبير ومعالج نفسي

Prof. Dr. Armin Kuhr
خبير ومعالج نفسي

Dr. Dipl.-Psych Heribert Limm
خبير ومعالج نفسي

Dr. med. Eva Renckly-Senel
طبيبة مختصة بالطب العام والمعالجة النفسية والطب الاجتماعي

تحمل كل من المختصين التوالي المسؤولية عن ترجمة دليل
الإرشاد إلى اللغة المقصودة وتنفيذه بلغة الأم:

Russisch: via text, Frankfurt am Main

Türkisch: Dr. Nezih Pala

Arabisch: Dr. Abdul Nasser Al-Masri

الكآبة النفسية

معرفتها، فهمها و المساعدة عليها

يرغب هذا الدليل ذو الفكرة الرشيدة وبشكل شمولي إعلام المصاين والأقرباء والأشخاص المهتمين بشكل عام من لهم أصول مهاجرة عن موضوع الكآبة. وبهذاً إعطائكم إمكانية بفهم الإزعاج والبحث عن إمكانيات المساعدة في الوقت المناسب. يتم في كل فصل منفرد الإجابة على الأسئلة العامة على حده، مثلاً "ما هو الإكتئاب؟" أو "كيف يتم معالجة الكآبة؟" ويوجد فهرس لعناوين مساعدة وقاموس صغير يتم فيه توضيح التعابير المهمة.

تم إنشاء الدليل الإرشادي هنا في إطار مشروع "مع المغتربين وللمغتربين" (MiMi)، الصحة المتعددة الثقافات في ولاية بايرن". وتجدون معلومات أخرى عن مشروع MiMi والمشاريع الأخرى للمركز الطبي للشعوب وألمجموعات العرقية (EMZ) على صفحة الشابكة: www.ethno-medizinisches-zentrum.de

تم تقديم هذا الدليل من قبل: